Intérêts de l'association du iPRF et du A-PRF aux substituts osseux en Chirurgie Orale : À propos d'un cas

Bos A^{1,3}, DUONG L^{1,2,3}, HAMDANI A^{1,3}, ZADIKIAN C², FOURNIER B^{2,3}, MAMAN L^{1,3}, FERRÉ F^{1,2,3}

1/ Service d'Odontologie, Hôpital Charles Foix, 94200 Ivry-sur-Seine, France.

2/ Centre de Recherche des Cordeliers, UMRS 1138, Molecular Oral Pathophysiology, Université de Paris, INSERM, Sorbonne Université, Paris, France.

3/ Université de Paris Cité, UFR de Santé.

Contact : francois.ferre@aphp.fr

Fig. 1 : Membrane de A-PRF

A-PRF et cicatrisation gingivo-muqueuse

- Deux types de PRF : iPRF = Prélèvement à l'état liquide / A-PRF = Prélèvement à l'état coagulé (Fig. 1)
- Propriétés : Relargage lent des facteurs de croissance et cytokines (TGF- β 1 + PDGF + VEGF, IL-1 β , IL-4, IL-6) par les leucocytes et les plaquettes sur une durée $\leq$ 10 jours
  - Effets pro-angiogéniques
  - Favorise la prolifération des cellules environnantes (fibroblastes ; kératinocytes)
  - Anti-inflammatoire
- Apports cliniques : Réduction de l'inflammation locale avec des suites opératoires moindres pour le patient, et une augmentation de l'épaisseur des tissus kératinisés sur les sites opérés.

Miron et al., Clin Oral Invest, 2017; 21:1913-1927

Fig. 2 : « Sticky-bone »

Apports du iPRF et du « sticky-bone » sur la régénération osseuse

- « Sticky-bone » (Fig. 2) :
  - À l'échelle macroscopique : Phénomène de coagulation grâce au iPRF, augmentation de la stabilité primaire du volume greffé (effet « sticky »).
  - À l'échelle microscopique : Augmentation des cellules et facteurs pro-ostéogéniques aux stades précoces (phosphatase alcaline ; BMP-2) et aux stades tardifs (ostéonectine) du métabolisme osseux, amélioration des paramètres liés aux ostéoblastes (prolifération ; différenciation ; adhésion ; viabilité ; expression de marqueurs), suggérant une amélioration du potentiel ostéogénique.

Farshidfar et al., Jpn Dent Sci Rev, 2022; 58:89-123

Fig. 3 : Vues au MEB des carottes osseuses au niveau des sites de forage à +6 mois d'une greffe osseuse par « sticky-bone ».

Fig. 4 : Vue peropératoire du défaut osseux à reconstruire.

Fig. 5 : Vue en fin d'intervention. Noter les membranes de A-PRF volontairement exposées au milieu buccal.

Fig. 6 : Vue occlusale du site à +1 mois. Noter le gain de gencive.

Fig. 7 : Pose d'implants à +6 mois.

Fig. 8 : CBCT en coupe para-sagittale montrant le volume osseux à +6 mois.

Fig. 9 : Reconstruction volumique de l'arcade maxillaire à +6 mois.

Cas clinique

- Situation initiale :
  - Homme de 64 ans, sans antécédents médico-chirurgicaux ni intoxication éthylo-tabagique.
  - Se présente dans le service pour une réhabilitation implanto-prothétique du secteur antérieur maxillaire.
  - Examen clinique révèle la présence de 11-12-21 à l'état de racines, ainsi qu'un odontome médian (mésiodens).
  - Examen cone beam (CBCT) révèle un volume osseux conséquent à reconstruire.
  - Décision prise d'avulser et de reconstruire dans le même temps, puis pose différée des implants à +6 mois.
- Phase pré-implantaire :
  - Avulsion des racines et exérèse de l'odontome, puis curetage et nettoyage du site osseux (Fig. 4).
  - Reconstruction par substitut osseux xéno-gène d'origine bovine (Bio-Oss®, GEISTLICH) mélangé à de l'iPRF.
  - Pour favoriser le gain de gencive kératinisée au cours de la même intervention, est réalisée une désunion volontaire de plaie, en laissant les membranes de A-PRF exposées au milieu buccal et en contact avec la membrane de collagène résorbable (CopiOs®, ZIMMER) (Fig. 5).
- Contrôle de cicatrisation muqueuse : Site est réépithélialisé avec gain de gencive conséquent à +1 mois (Fig. 6).
- Phase implantaire : À +6 mois...
  - Examen clinique montrant une quantité favorable de tissus kératinisés néoformés.
  - Examen cone beam montrant un volume osseux intégré, faiblement résorbé, favorable à la pose d'implants (Fig. 8).
  - Le site montre un os vascularisé et dense. Un prélèvement osseux est réalisé lors de la pose de l'implant (Fig. 7).
  - L'analyse histologique par microscopie à balayage (Fig. 3) et par coloration à l'hémalum-éosine (Fig. 10) montrent une composition de différents tissus comprenant de l'os néoformé, du tissu fibreux et la présence du substitut osseux.

Fig. 10 : Coloration à l'hémalum-éosine des carottes osseuses issues du greffon à +6 mois.

NO : nouvel os
SO : substitut osseux
TF : Tissu fibreux